

串

雅

串雅外編卷二

藥外

針法

猢猻勞

小兒有此症求食不止終夜不睡用針刺

兩手面中三指中節能曲處週歲者用中號針六

七歲用大號針刺進半分許遇骨微位即拔出不

可誤針筋上若疳甚無水刺數日方有白水不甚

者即有白漿刺數日隨有血一指有刺血一指不

針法

一

刺一指有血停此二指不刺若六指俱有血病痊  
不復刺矣凡刺須隔一日俟天晴雨則無益刺後  
即得睡減貪饒最忌棗栗乾甜果物則復發若初  
刺有血非此疾矣

挑悶疹子

分開頂門內有紅筋紅源挑破即止

喉痺

見紅上紅疣瘡用針挑破即愈

百發神針

治偏正頭風漏肩鶴膝寒濕氣半身不

逐手足癱瘓痞塊腰疼小腸疝氣癰疽發背對口  
痰核初起不破爛俱可用按穴針之

乳香 沒藥 生川附子 血竭 川烏 草烏

檀香末 降香末 大貝母 麝香錢各三 母丁

香四十九粒 淨蘄艾綿一兩或二兩 作針

消癖神火針

蜈蚣一條 木鱉 五靈脂 雄黃 乳香 沒藥

阿魏 三稜 蓬朮 甘草 皮硝錢各一 開揚花

硫黃 山甲 牙皂錢各二 麝香錢三 甘遂五分 艾絨

針法 二

二  
兩  
作  
針

陰  
症  
散  
毒  
針

乳  
香  
沒  
藥

羌  
活

獨  
活

川  
烏

草  
烏

白  
靈

芷  
細  
辛

牙  
皂

各  
五  
分

硫  
黃

山  
甲

大  
貝

靈

脂  
肉  
桂

雄  
黃

各  
一  
錢

蟾  
酥

三  
分

麝  
香

三  
分

艾  
絨

一  
兩

錢

作  
針

藥外

灸法

醫小兒 小兒目視不轉睛指甲黑叫作鴉聲是死形無可治惟用此法灸之十灸十生將左右兩手灣處各灸一穴左右兩腳指將第二腳指縫頭處亦必各灸一穴將痰瀉出即回生奇妙不可言

雞爪風

婦人月家

天產後

得此不時發手足及指拘攣拳

束如雞爪頗疼痛急于左右膝骨蓋下兩傍各有

一小窩共四穴

俗謂鬼眼

各灸三壯立愈

灸法

三

乾霍亂死灸法

心頭微熱者以鹽填臍內用艾灸不計數以醒為度

附子灸 癰疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉以大附子水浸透切大片厚三分安瘡口艾隔灸數日一灸至六七次服內托藥自然長滿為末作餅用亦可

黃蠟灸 治癰疽等毒

白麵水和成塊照毒根盤大小作圈厚一指高寸

餘粘肉上外以絹帛護帛<sup>上</sup>加濕布圍住將黃蠟搗薄片入麵圈內以熨斗火運偏蠟化即痛則毒淺若不覺至蠟滾沸逐漸添蠟俟不可忍沃冷水候凝取去瘡忽痛者毒盛灸未到也不妨再灸輕一二次重三四次忌房事氣惱發物

## 灸癰

日中時灸病處影上三炷灸之咒曰癰中盡毛戎戎若欲治待日中

又法 八月八日出時令病人正向東南戶內長跪



平舉兩手持胸兩邊取肩頭小垂際骨解宛：中  
灸之兩火俱下各三壯若七壯十壯愈

灸耳聾

濕土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一灸  
乃愈

疝氣偏墜

淨草一條量患人口兩角為一則摺斷如此三則  
摺成二角如八字樣以一角安臍中心兩角安臍  
下兩旁尖盡處是穴若患在左灸右在右灸左兩

邊俱患兩穴皆灸艾炷如麥粒大灸十四壯或二十壯即安又灸兩足三陰交穴尤效

### 灸癰疽

男左女右以篾一根前齊中指端後至手腕橫紋凹中截斷為準却以竹一根兩頭閣起令病人騎之兩足不着地挺身正坐將前篾植於竹上以正頭植骨脊中盡處各開一寸名騎竹馬法灸七壯灸畢宜用乳香真茱豆粉為末水調服之以防火氣入心

胡桃灸 破傷風及瘋犬傷神效

胡桃殼半個填稠人糞滿仍用槐白皮襯扣傷處以艾灸之遍身臭汗出其人大困即愈遠年者將傷處如前灸之亦愈

雞子灸 凡毒初起紅腫無頭

雞子煮熟對劈去黃用半箇合毒上以艾灸三壯即散若紅腫根盤大似鴨蛋如法灸亦可

苦瓠灸 治懸癰

擇神人不在日空心用井花水調百藥煎末一椀

服之微利後却用秋壺盧一名苦不老生在架上而苦者切片置瘡上灸二七壯蕭端式病此連年一灸遂愈

桑木灸 治癰疽發背不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡癰瘰流注瘰癧頑瘡惡瘡久不愈俱用此灸之未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取其通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息灸患處每吹灸片時以瘡肉癢動為度內服補托藥誠良方也

梔灸 治乳腫

梔一個用灯草四根十字排梔內頭各露寸許再用紙條一寸五分闊用水濕了蓋梔內灯草下紙與梔口齊將梔覆患處由灯草頭在外艾一大團放梔底火灸之艾盡再添至梔內流水氣內痛覺止方住甚者次日再灸一次必消

灸目

正月十六日用川椒末一二分入頭垢和為蚕豆大四之似窩置於眼角別揉熟艾米粒大內凹中

每眼角灸七壯或九壯如此俟清明日照前復灸  
之連灸三年則目加精采至老不昏

麻葉灸 治癰瘰瘡

七月七日採麻花五月五日採麻葉搗作炷圓灸  
瘡上百壯次燒胡桃松脂研敷即愈

藥外

熏法

鵝掌風

真蘄艾四五兩將水三四碗煮五六沸入大口瓶內盛之用麻布雙層縛瓶口將手心放瓶口上熏之如藥水冷再熏如神

蜈蚣咬

杉木皮或枝燒烟熏立刻止痛比蜘蛛尤妙

牛皮癬

多生小瘡

灸二

熏法

八

水銀一分錢 芸香一分錢 大棗七枚同搗爛為四丸每  
夜熏一丸速愈

口眼歪斜

巴豆三粒 麝香分三 共研將熱水一鐘藥藏鐘底放手  
心右斜放左手心左斜放右手心

久病截瘡

老薑二斤搗爛置於滾水一大桶內坐布帳中脫  
衣坐卧桶上熏透即愈第一禁風

痘不脫靨



燒乳香熏之

蟲牙

天仙子一撮入小口瓶內燒烟竹筒引烟入蟲孔  
內熏之即死永不發

又天仙子入瓶內熱湯淋下口合瓶口令氣熏之冷  
更作盡三合乃止有涎津可去甚效

頭風揷耳

黃蠟兩溶化以白紙濶二寸長五寸在蠟上拖勻  
真蘄艾揉軟薄攤蠟上箸卷為筒揷耳內一頭火

熏法

九

點燃烟氣透腦其痛即止左痛插右耳右痛插左  
耳至重不過二次

喉痺

蓖麻仁研爛紙卷作筒燒烟熏吸即通或取油作  
樵尤妙名聖烟筒喉痺緊急用此即破

喉症開關

牙皁 巴豆共為末米湯調刷紙上晒乾作樵子  
點火以烟熏鼻孔立能開口鼻流涕專治十八種  
喉閉

小兒脫肛

五梧子為末先以艾絨梧子末卷成筒放便桶內以瓦盛之令病者坐桶上以火點着使烟熏入肛門其肛自上隨將白礬末捺之其肛自緊再不復脫

霍亂轉筋 身冷心下微溫者

硃砂<sub>研</sub>二兩 蠟<sub>二</sub>和丸着于火籠中熏之周圍厚覆令烟洩兼牀下着火令腹微暖良久當汗出而醒

疥瘡

日外紀 卷一

熟蘄艾二木鱉子三雄黃二硫黃一為末揉入艾中分作四條每一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通聖散

癰瘰頭風 骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下血一

切風瘡

川烏頭 草烏頭 兩頭尖各三錢硫黃 麝香

丁香各一錢木鱉子五箇為末以熟蘄艾揉軟合一處

鈔底色裏燒熏病處名雷丸

手足痛風 冷痛如虎咬者

樟木屑斗急流水石一煎極滾泡之乘熱安足于桶  
上熏之以草薦圍住勿令湯氣入目其功甚捷  
拳毛倒睫

無名異末紙卷作撚點燈吹殺熏之睫自起

破傷風 口噤身強

肉蓯蓉切片晒乾用一小盞底上穿穴燒烟熏患  
處累效

咳嗽熏法

熏黃一兩以蠟紙條捲作筒十枚燒烟吸嚥取吐

熏法

十一

止一日一熏椎食白粥七日後以羊肉羹補之

女人病邪

與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者

雄黃

兩一松脂

兩二溶化

以虎爪攪之

丸如彈子

大夜

燒籠

中令女坐其上

以被蒙之

露頭在外

不過三

劑自斷

仍以雄黃

人參防風

五味子

等分為末

每

旦井

水服之

喉閉

竹紙

巴豆

令滿

作紙撚

點燈

旋吹滅之以烟

熏喉間

即吐惡血

而消或刺入

喉間

出紫血

亦愈

蓋烟喉病發于六腑者引手可探及刺破瘀血即已若發于五臟則受毒牢深手法藥力難到惟用紙撚為第一

舌脹出口

蓖麻取油蘸紙撚燒烟熏之即腫脹皆消并治牛馬六畜舌脹

手汗

黃芪一兩葛根一兩荊芥三錢水煎湯一盆熱熏而濕洗三次即無汗

熏嗽 治風入肺久嗽者

鵝管石 雄黃 蔚金 款花為末和艾用薑一片置舌上以藥艾于薑上灸之取烟入喉中愈

青布熏

惡瘡防水青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛瘡傷風水用青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒癢癰瘡潰爛陳艾五錢雄黃二錢青布作大炷點火熏之熱水流數次愈

支太醫桃葉熏



水二石煮桃葉取七斗安牀簣下厚被蓋卧床上  
乘熱熏之少時當雨汁汗遍去湯速粉之并灸大  
椎穴此法治天行病

藥外

貼法

痢疾塞肚

菜豆粒七 胡椒粒七 麝香一厘 膠棗一枚 共搗爛放瓶內  
色好患者取一丸貼臍上宜用端午日合

小兒赤眼

黃連為末水調敷脚心

小兒重舌 又名雀舌

巴豆粒半 飯粘粒四五 共搗為餅如黃豆大貼眉心中

貼法

齒

閒待四圍起泡去之即愈  
收陰症傷寒

雞子放臍眼內一時一換四五換即愈矣陰氣盡  
收子內

止自汗

鬱金末卧時調塗于乳上

截驚法

芭蕉油薄荷汁煎勻塗頭頂囑門塗四肢笛手  
足心勿塗甚效

嬰兒瘡疾

代赭石五枚煨紅醋淬硃砂五分砒霜一豆大同  
以紙色七重打濕煨乾入麝少許為末香油調一  
字塗鼻尖上及眉心四肢神應

隔皮取膿

治諸般腫毒

驢蹄

細切兩炒

蕎麥麵

一兩

白鹽

五錢

草烏

四錢去皮

為末調

作餅子

慢火炙

黃出火毒

研米醋調

成膏用白紙

攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

瘡塊

紅芥菜子不拘多少生薑汁浸一宿大約芥子一酒杯如麝香一錢阿魏三錢搗爛如膏攤布上貼患處外用汗巾紮緊一宵貼過斷無不消

### 牙齒疼痛

輕粉錢大蒜一瓣杵餅安膈骨前陷中先以銅錢隔了用蜆蓋定紮住一宿愈左疼安右右疼安左又左牙疼敷右大指腕上右疼敷左大指腕上

### 截瘡丹

班蝥 巴豆肉 硃砂各一錢 麝香二分 雄黃五分 蟾

酥五分黑棗二三箇擣丸如菉豆大貼眉心穴一周時  
揭下投長流水中

貼臍截瘡

胡椒 雄精 等分研末將飯研爛為丸桐子大  
硃砂為衣將一丸放臍中外膏藥貼之即止

難產仙方

草麻仁取白仁七箇麝香三分共一處搗如泥用  
絹帛色之勒在臍中即時產下如倒生者用穩婆  
送進片時即順下

如神丹 治難產

巴豆三粒 草麻子七粒 麝香許少 研成一餅貼臍上  
即產：下即去之

地黃膏 治眼腫立效

生地一兩 寒水石五錢 黃連一兩 黃柏一兩 為末 生地汁調餅貼太陽上

水瀉不止

木鱉仁五個 母丁香五個 麝香一分 研末 米湯調作膏 納臍中貼之外以膏藥護住

痢疾噤口

木鱉仁

六個

研泥分作二分用麵燒餅一箇切作兩

半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半箇熱餅其痢即止遂思飲食

小兒口內流涎

天南星一個為末醋調搽兩足心過夜即安然洗去

牙痛

蘿蔔子十四粒生研末以人乳和之左痛點右鼻右痛點左鼻

串雅外編 卷二

貼法

七



藥外

蒸法

厲風

先將元參

苦參

沙參

荊芥

防風

厚朴

白芷

陳皮

蔓荊子

威靈仙

麻黃

各一兩

桃

枝柳枝煎湯洗之換一身新單青布衣服掘一地坑深尺許方廣約可容身卧者用栗炭四五十斤燒坑內極熱潑滾醋數十碗次去炭鋪草薦于內令病者卧于薦上厚蓋被取汗：出一瞬起別換

衣進飲食後用五爪藤煎湯熏洗數次自愈服敗  
毒丸藥

骨蒸發熱

雄黃兩一入小便一升研如粉乃取黃理石一枚方  
圓一尺者炭火燒之三食頃濃淋汁于石上置薄  
氈于上患人脫衣坐之衣被圍住勿令泄氣三五  
度瘥

脚氣腫痛

樟腦兩二烏頭兩三為末醋糊丸彈子大每置一丸于

足心踏之下以微火烘之衣被圍蓋汗出如涎為效

### 風濕痰病

人坐密室中左用滾水一盆右用炭火一盆前置一桌書一冊先將無油新巴豆四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅如病在左令病人將右手仰置書上安藥于掌上心以盥安藥上傾熱水入盥內水涼即換良久汗出立效病右安左掌心一云隨左右安之

珊瑚蒸 治中風不語脉沉口禁

黃芪 防風 共煎湯數斛置牀下熏蒸藥入膝  
理周時可瘥

千金神草方 治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周  
身麻木或酸疼口眼歪斜並皆神效

草麻子草一種秋夏用葉春冬用子俱得一二十  
斤入水甑內置大鍋上蒸半熟取起先將綿布數  
尺雙摺浸入蒸葉子湯內取出乘熱敷患處却將  
前葉子熱鋪布上一層候溫再換熱葉子一層如

此蒸換必以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次其病即愈內以疏風活血之劑服之

阮河南桃葉蒸

治發汗汗不出用此蒸之可救

燒地令熱去火以水少灑之布乾桃葉于上厚二三寸安席葉上卧溫覆得大汗被中傳粉極燥便瘥凡柏葉麥麩蚕沙皆可如此用之

蠶沙蒸

治患風冷氣痺及癰瘡蓋蚕屬火性燥能

勝風去濕

醇酒三升拌原蚕沙五斗甑蒸於暖室中鋪油單

蒸法

干

上令患者就患處一邊卧沙上厚蓋取汗若虛人  
須防大熱昏悶令露頭面一次不愈閒日再蒸無  
不效

蒸脚氣 服藥不效者

於地上掘作盆子深六七寸可容脚用炭火燒赤  
然後噴醢醋遍地鋪淨葱不去皮根具小牀坐定  
用脚伸地盆內蒸候汗出如膠拭去忌房事不兩  
三次必愈神效

荊葉蒸

治 脚氣<sub>及風</sub>濕痛不止

荆葉不限多少置大甕中其下著火溫之病人置  
<sup>足</sup>葉中須臾當汗出蒸時常旋旋喫飯稍倦即止便  
以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒亦可以瘥為度  
按此法止宜施之野人李仲南永類方云治腳氣  
諸病用荆莖置罈中燒煙熏涌泉穴及痛處使汗  
出即愈此法貴賤皆可用

藥外

洗法

小兒咳嗽

生薑四兩煎濃湯沐浴即愈

洗頭明目

鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一  
年眼如童子加椿皮灰尤佳

正月七日 二月八日 三月四日 四月五日

五月二日 六月四日 七月七日 八月三日

洗法

主



九月二十日 十月二十二日 十一月二十九日  
十二月十四日燒之或洗字之訛

洗癩頭

蝸牛數十條洗之二次必愈水三碗煎蝸牛三十條足矣

洗癰疽

腫時用紫葛天蕎麥忍冬藤金絲草各等分煎湯洗潰時白芷甘草羌活黃芩露蜂房赤芍當歸頭  
先將猪前蹄一隻煮汁去油花取清汁煎藥去渣

溫洗以絹拭之

### 洗凍瘡

黃柏皮硝各等分研細末已破者柏七硝三末破者紅腫柏硝各半初起者硝七柏三皆用冷水調搽俟乾以熱水洗去再搽再乾再搽如此三遍一日定痛三日全愈此神方也

五枝浴 治大風年深不愈面毛脫落鼻梁崩損不踰月取效如神

桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日

候湯如抽出浴安矣

楊枝浴 治痘瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者

水楊枝葉

無葉用枝五斤

流水一大釜煎湯溫浴之如冷添

湯良久照見纒起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴痘不行漿乃氣滯血滯腠理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿

貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此而升之其效更速寒風亦不得而阻之矣

洗青盲

昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故青桑葉新研焙乾逐月按日就地上燒存性每以一合子磁器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗

正月初八	二月初八	三月初六	四月初四
五月初六	六月初二	七月初七	八月二十
九月十二	十月十三	十一月初二	十二月

串雅外編

卷二

洲注

二十

二十四

藥外

熨法

痞積

艾綿四兩捏如患大川椒四兩拌艾中粗草紙包  
安癖積上以湯壺熨內有響聲即消

皮<sup>柳</sup>熨

治氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可忍

走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也  
白酒煮楊柳白皮熨之有赤點處鑱<sup>針</sup>去血妙凡諸  
卒腫急痛熨之皆止

熨法

二十五

藥外

吸法

還魂丹

治急慢驚風吹鼻

二寸蜈蚣一分麝香四兩白芷與天麻更加二字  
黃花子死在陰司要返家共為末吹鼻即甦

青火金針

治頭風

火硝

一兩青黛

川芎

薄荷各一錢

為末口含冷水

用此吹鼻

傷寒欬逆

服藥無效

雄黃三錢酒蓋一煎七分乘熱嗅其氣即止

水腫上氣 欬嗽腹脹

熏黃兩一款冬花分二熟艾分一以蠟紙鋪艾灑二末于

上荻管成筒燒煨吸嚙三十口則瘥三日一劑百

日斷鹽醋

燒香治勞

元參斤一甘松兩六為末煉蜜斤一和勻入瓶中封閉地  
中埋窖十日取出更用炭末六兩蜜六兩同和入  
瓶更窖五日取出燒之常令聞香疾自愈



冬月喉痺 腫痛不可下藥者

蛇牀子燒烟于瓶中口含瓶嘴吸烟其痰自出

一切咳嗽 不問久近晝夜無時

佛耳草

文五十

款冬花

文二百

熟地黄

二兩

焙研末每用

二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐出兩服

眼愈

碧雲散

治目赤腫脹羞明昏暗隱澁疼痛眵泪風

痒鼻塞頭痛腦酸外翳板睛諸症鵝不食草

曬乾二錢

青黛

川芎

各一錢為細末噙水一口每以米許嚥

吸法

二七

入鼻泪出為度

頭風苦痛

大蒜頭七箇去皮燒紅地以蒜逐個于地上磨成膏  
子却以殭蠶一兩去頭足安蒜上碗覆一夜勿令

透氣只取蚕研末嚙入鼻內口中含水更效

石南葉散

小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風

致腫人不正觀東見西觀西見東

石南一兩黎蘆三分瓜丁

即瓜蒂

五七個為末每吹少許

入鼻一日三度內服牛黃平肝藥

單驚

姜黃片紅棗二枚巴豆三粒同搗如泥用口津調和  
分作二丸用絹包好線繫男左女右一握手一塞  
鼻蓋被出汗即愈此藥治三人如乾用唾津拌勻  
包紮如法治之。當另行寫倒睫拳毛因風入脾經致使風  
痒不住手擦日久則赤爛拳毛入內  
木鱉仁槌爛以絲帛色作條左患塞右鼻右患塞  
左鼻其毛自分上下再服蟬蛻葉自愈

藥外

雜法

痔瘡坐袋

乳香沒藥龍骨赤石脂海螵蛸輕粉木鱉各三錢  
共為末以絹袋盛之每日坐不必洗坐二十一日  
無不愈

濕瘡踏袋

治寒濕瘡并脚氣

川椒一斤盛粗布袋中放火踏上下用火烘跣足  
踏其上蓋椒性熱而散加以火氣上逼寒濕自去

而愈甚妙

### 釣骨丸

栗子肉上皮半兩為末鮎魚肝<sup>胆</sup>一個乳香二錢五分同搗為丸桐子大看骨哽遠近以線繫線<sup>帛</sup>裹一丸水潤吞之提線釣出也

### 黃疸取黃

紅連紙一張裁為四條筆管捲如砲竹式口上糊粘固外用黃蠟一兩鐵杓將紙筒四圍澆勻不可使蠟入內患人仰卧筒套臍上外以麵作圈護定

勿倒頭上點火燒至麵所剪斷另換新筒看臍中有黃水如雞子餅者取出輕者四五根重者六七根取盡黃為度

香櫞包法 治頭風

香櫞不拘新舊一枚切開鴨蛋一枚煮熟切兩半開入香櫞內每邊包在太陽上得熱即愈

耳鳴塞耳 耳鳴晝夜不止者

烏頭燒灰石菖蒲等分為末綿裹塞之日再取為

效度

產婦衄血 口鼻起黑氣名胃肺敗

紅絲線一條本婦頂心髮二根紮緊中指節即止  
消毒燈照 一切癰疽發背無名腫毒及對口諸瘡  
已潰未潰無不神效

昔者炒研細末水澄乾以清

一二十年舊船底上石灰生青桐油調將光青布  
照瘡大小攤貼又用青布作撚蘸桐油點火在瘡  
上打粹覺痒愛打不論條數灰乾換貼再打知痛  
為度紅退毒消神效秘驗

掌中取積

甘遂巴豆甘薑韭子檳榔各等分為細末米飯為  
丸如彈子大用時早晨花椒湯淨手將香塗掌中  
次將藥擦一時便瀉欲止以冷水淨手即住大小  
胸中有積皆治

神燈照法 治痘瘡塌之極火到痒除

川椒 艾葉 紅棗 芫荽 茵陳 乳香 白

芷梢 陳香櫟 安息香共為末作紙撚熏照

縮贅瘤

甘草煎膏筆按之四圍上三次乃用芫荽花大戟甘



遂等分為末醋調別以筆妝其中勿近甘草次日  
縮小又以甘草膏妝小暈三次如前仍上此藥自  
然焦縮

### 彭醫官釣骨法

鹽麩子根搗爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽  
引上下便釣出骨也

提金散

大便閉塞服藥不通者

滄鹽

錢三

屋簷爛草節七個為末每用一錢竹筒吹

入肛內一寸取通

臃脹取水

真輕粉二巴霜四生硫黃錢一加麝更妙同研成餅  
先以白帛一片鋪臍上以藥餅放外上用帛綁住  
約人行五六里自能瀉下黃水待至三五度除去  
藥溫粥補之久患隔日取日一餅可治二三十人  
病愈後忌飲涼水

黃疸取水

大鯽魚一個鱗骨俱搗爛加麝香分三同魚熟搗成餅  
大其中再加麝二分入居餅中間貼在臍上將荷

葉二三層貼餅上用布縛不及周時出黃水即消  
永不再發

叔腫法 治水腫及腫核腫毒

凡水腫脹葉末全消者甘遂末塗腹繞臍令滿內  
服甘草水其腫便去若腳氣上攻結成腫核及一  
切腫毒用甘草遂末水調傳腫處即濃煎甘草汁  
服其腫立散

頭痛

生蘿蔔取自然汁入生龍腦調勻昂頭使人滴鼻

竅右痛灌左鼻左痛灌右鼻俱痛並灌之其效如神

又法

蓖麻子一粒搗碎同棗肉紫須同搗勻丸如黃豆大外用絲綿裹之內鼻孔少頃必有清涕流出即將丸藥取出其痛即愈永不再發

引火法 人病厥逆之症不敢用藥以此治之吳茱萸一兩為末以麵半兩水調成糊以布如錢大攤成膏貼湧泉穴內則手足不逆矣

又法 治虛火沸騰

附子一個為末米醋調成膏貼湧泉穴上然後用  
六味湯大劑與之火不再沸

衄血

左鼻孔出血者以色線繫右手手中指根右孔血出  
繫左手中指根兩孔俱出者繫二指根

溫臍種子

五靈脂

白芷

青鹽

各二錢

麝香

分

為末

以蕎麥

湯和搓成條圈於臍上以葉實其中用艾灸之但

臍內微溫即愈不過二三度

串雅外編卷之二終

串雅外編

雜法

三